

Reiseimpfungen: Die ultimative Checkliste für die nächste Reise

Wer impft und informiert?

- Hausärztin oder Hausarzt
- Gesundheitsämter
- Reise- und Tropenmedizinisches Fachpersonal
- Spezielle Impfstandorte für Gelbfieberimpfung

Individuelle Risikofaktoren für Reiseimpfungen

- Reiseziel und Reiseroute
- Reisezeit und Zeit bis zur Abreise
- Dauer der Reise
- Reisegrund, Reiestil und geplante Aktivitäten
- Alter und Vorerkrankungen

Achtung: Das Impfprogramm sollte zehn bis 14 Tage vor der Abreise abgeschlossen sein!

Lange vor der Abreise

- Über erforderliche und empfohlene Impfungen informieren
- Termin für eine reisemedizinische Beratung vereinbaren
- Einen auf individuelle Risikofaktoren abgestimmten Impfplan erstellen lassen

Über einen Monat vor der Abreise

- Cholera:** zwei Schluckimpfungen im Abstand von einer bis sechs Wochen
- FSME:** drei Impfdosen innerhalb von fünf bis zwölf Monaten (Schnellimpfschema möglich)
- Hepatitis A:** zwei Impfdosen im Abstand von sechs Monaten
- Japanische Enzephalitis:** zwei Impfdosen im Abstand von 28 Tagen (Schnellimpfschema möglich)
- Tollwut:** drei Impfdosen innerhalb von 28 Tagen (Schnellimpfschema möglich)

Drei Wochen vor Abreise

- Typhus:** drei Schluckimpfungen innerhalb von fünf Tagen oder eine injizierte Impfdosis

Zwei Wochen vor Abreise

- Gelbfieber:** eine Impfdosis bei autorisierten Ärztinnen oder Ärzten
- Meningokokken:** eine Impfdosis

Am Abreisetag

- Impfausweis nicht vergessen!

